

レジメン登録書

レジメン名	mFOLFOX6	1クール of 週数	2	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	day1
レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1
5-FU	400	mg/m ²	全開投与	day1
5-FU	2400	mg/m ²	46時間	day1

【特記事項】

レジメン登録書

レジメン名	B-mab+mFOLFOX6	1クール of 週数	2	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ベバシズマブ	5	mg/kg	90-30分(*)	day1
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	day1
レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1
5-FU	400	mg/m ²	全開投与	day1
5-FU	2400	mg/m ²	46時間	day1

【特記事項】
(*)ベバシズマブの投与時間
初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	C-mab+mFOLFOX6	1クール of 週数	2	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
セツキシマブ	初回 400 2回目以降 250	mg/m ²	1-2時間(*)	day1. 8
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	day1
レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1
5-FU	400	mg/m ²	全開投与	day1
5-FU	2400	mg/m ²	46時間	day1

【特記事項】
(*)セツキシマブの投与時間
初回は2時間、2回目以降は1時間に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	P-mab+mFOLFOX6	1クール of 週数	2	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
パニツムマブ	6	mg/kg	1時間	day1
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	day1
レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1
5-FU	400	mg/m ²	全開投与	day1
5-FU	2400	mg/m ²	46時間	day1
【特記事項】				

レジメン登録書

レジメン名	FOLFIRI	1クール of 週数	2	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
イリノテカン	150	mg/m ²	90分	day1
レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1
5-FU	400	mg/m ²	全開投与	day1
5-FU	2400	mg/m ²	46時間	day1

【特記事項】

レジメン登録書

レジメン名	B-mab＋FOLFIRI	1クール of 週数	2	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ベバシズマブ	5	mg/kg	90-30分(*)	day1
イリノテカン	150	mg/m ²	90分	day1
レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1
5-FU	400	mg/m ²	全開投与	day1
5-FU	2400	mg/m ²	46時間	day1

【特記事項】
(*)ベバシズマブの投与時間
初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	C-mab＋FOLFIRI	1クール of 週数	2	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
セツキシマブ	初回 400 2回目以降 250	mg/m ²	1-2時間(*)	day1. 8
イリノテカン	150	mg/m ²	90分	day1
レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1
5-FU	400	mg/m ²	全開投与	day1
5-FU	2400	mg/m ²	46時間	day1

【特記事項】
(*)セツキシマブの投与時間
初回は2時間、2回目以降は1時間に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	P-mab＋FOLFIRI	1クール of 週数	2	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
パニツムマブ	6	mg/kg	1時間	day1
イリノテカン	150	mg/m ²	90分	day1
レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1
5-FU	400	mg/m ²	全開投与	day1
5-FU	2400	mg/m ²	46時間	day1

【特記事項】

レジメン登録書

レジメン名	RAM＋FOLFIRI	1クール of 週数	2	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ラムシルマブ	8	mg/kg	60-30分(*)	day1
イリノテカン	150	mg/m ²	90分	day1
レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1
5-FU	400	mg/m ²	全開投与	day1
5-FU	2400	mg/m ²	46時間	day1

【特記事項】
(*)ラムシルマブの投与時間
初回は60分、2回目以降は30分に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	AFL＋FOLFIRI	1クールの変数	2	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
アフリベルセプト ベータ	4	mg/kg	1時間	day1
イリノテカン	150	mg/m ²	90分	day1
レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1
5-FU	400	mg/m ²	全開投与	day1
5-FU	2400	mg/m ²	46時間	day1
【特記事項】				

レジメン登録書

レジメン名	XELOX	1クール of 週数	3	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	day1
カペシタビン	2000	mg/m ²	経口	1日2回 day1-14
【特記事項】				

レジメン登録書

レジメン名	B-mab＋XELOX	1クール of 週数	3	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ベバシズマブ	7.5	mg/kg	90-30分(*)	day1
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	day1
カペシタビン	2000	mg/m ²	経口	1日2回 day1-14

【特記事項】
(*)ベバシズマブの投与時間
初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	SOX	1クール of 週数	3	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	day1
テガフル・キメラシル・ オテラシルカリウム(*)	80-120	mg/body	経口	1日2回 day1-14
【特記事項】 (*)体表面積による換算 1.25m ² 未満:80mg/日 1.25m ² -1.5m ² :100mg/日 1.5m ² 以上:120mg/日				

レジメン登録書

レジメン名	B-mab+SOX	1クールの数	3	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ベバシズマブ	7.5	mg/kg	90-30分(**)	day1
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	day1
テガフル・キメラシル・ オテラシルカリウム(*)	80-120	mg/body	経口	1日2回 day1-14

【特記事項】
(*)体表面積による換算
1.25m²未満:80mg/日
1.25m²-1.5m²:100mg/日
1.5m²以上:120mg/日

(**)ベバシズマブの投与時間
初回は90分、2回目は60分
3回目以降は30分に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	C-mab+SOX	1クール of 週数	3	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
セツキシマブ	初回 400 2回目以降 250	mg/m ²	1-2時間(**)	day1. 8. 15
オキサリプラチン	130	mg/m ²	2時間	day1
テガフル・キメラシル・ オテラシルカリウム(*)	80-120	mg/body	経口	1日2回 day1-14

【特記事項】
(*)体表面積による換算
1.25m²未満:80mg/日
1.25m²-1.5m²:100mg/日
1.5m²以上:120mg/日

(**)セツキシマブの投与時間
初回は2時間、2回目以降は1時間に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	IRIS	1クール of 週数	4	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
イリノテカン	100	mg/m ²	90分	day1. 15
テガフル・キメラシル・ オテラシルカリウム(*)	80-120	mg/body	経口	1日2回 day1-14
【特記事項】 (*)体表面積による換算 1.25m ² 未満:80mg/日 1.25m ² -1.5m ² :100mg/日 1.5m ² 以上:120mg/日				

レジメン登録書

レジメン名	B-mab+IRIS	1クール of 週数	4	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ベバシズマブ	5	mg/kg	90-30分(*)	day1. 15
イリノテカン	100	mg/m ²	90分	day1. 15
テガフル・キメラシル・ オテラシルカリウム(*)	80-120	mg/body	経口	1日2回 day1-14

【特記事項】
(*)体表面積による換算
1.25m²未満: 80mg/日
1.25m²-1.5m²: 100mg/日
1.5m²以上: 120mg/日

(*)ベバシズマブの投与時間
初回は90分、2回目は60分
3回目以降は30分に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	B-mab＋FOLFOXIRI	1クール of 週数	2	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ベバシズマブ	5	mg/kg	90-30分(*)	day1
イリノテカン	165	mg/m ²	1時間	day1
オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	day1
レボホリナートカルシウム	200	mg/m ²	2時間	day1
5-FU	3200	mg/m ²	46時間	day1

【特記事項】
(*)ベバシズマブの投与時間
初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	B-mab＋XELIRI	1クール of 週数	3	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ベバシズマブ	7.5	mg/kg	90-30分(*)	day1
イリノテカン	200	mg/m ²	90分	day1
カペシタビン	1600	mg/m ²	経口	1日2回 day1-14

【特記事項】
(*)ベバシズマブの投与時間
初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	B-mab＋カペシタビン	1クールの数	3	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ベバシズマブ	7.5	mg/kg	90-30分(*)	day1
カペシタビン	2000	mg/m ²	経口	1日2回 day1-14

【特記事項】

(*)ベバシズマブの投与時間
初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	B-mab+TAS-102	1クール of 週数	4	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ベバシズマブ	5	mg/kg	90-30分(*)	day1. 15
トリフルリジン・ チピラシル(**)	70-150	mg/body	経口	1日2回 day1-5、8-12

【特記事項】
(*)ベバシズマブの投与時間
初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮することも可能
(**)体表面積による換算
1.07m²未満 : 70mg/日 1.38m²-1.53m²未満: 100mg/日 1.84m²-1.99m²未満: 130mg/日
1.07m²-1.23m²未満: 80mg/日 1.53m²-1.69m²未満: 110mg/日 1.99m²-2.15m²未満: 140mg/日
1.23m²-1.38m²未満: 90mg/日 1.69m²-1.84m²未満: 120mg/日 2.15m²以上 : 150mg/日

レジメン登録書

レジメン名	C-mab＋イリノテカン	1クール of 週数	2	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
セツキシマブ	初回 400 2回目以降 250	mg/m ²	1-2時間(*)	day1. 8
イリノテカン	150	mg/m ²	90分	day1

【特記事項】
(*)セツキシマブの投与時間
初回は2時間、2回目以降は1時間に短縮することも可能

レジメン登録書

レジメン名	C-mab+ビニメチニブ+エンコラフェニブ			1クール未満	1	週
対象疾患	大腸がん					
診療科名	外科・消化器					

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
セツキシマブ	初回 400 2回目以降 250	mg/m ²	1-2時間(*)	day1
ビニメチニブ	90	mg	経口(**)	1日2回 連日投与
エンコラフェニブ	300	mg	経口	1日1回 連日投与

【特記事項】
(*)セツキシマブの投与時間
初回は2時間、2クール目以降は1時間に短縮することも可能
(**)ビニメチニブ 45mg/回 1日2回

レジメン登録書

レジメン名	ニボルマブ	1クール of 週数	2	週
対象疾患	大腸がん (MSI-High)			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ニボルマブ	240	mg/body	30分	day1
【特記事項】				

レジメン登録書

レジメン名	ニボルマブ(480mg/4週)	1クール of 週数	4	週
対象疾患	大腸がん(MSI-High)			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ニボルマブ	480	mg/body	30分	day1
【特記事項】				

レジメン登録書

レジメン名	ニボルマブ＋イピリウムマブ	1クール of 週数	3	週
対象疾患	大腸がん (MSI-High)			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
ニボルマブ	240	mg/body	30分	day1
イピリウムマブ	1	mg/kg	30分	day1
【特記事項】				

レジメン登録書

レジメン名	C-mab	1クール of 週数	1	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
セツキシマブ	初回 400 2回目以降 250	mg/m ²	1-2時間(*)	day1
【特記事項】 (*)セツキシマブの投与時間 初回は2時間、2回目以降は1時間に短縮することも可能				

レジメン登録書

レジメン名	P-mab	1クール未満	2	週
対象疾患	大腸がん			
診療科名	外科・消化器			

抗がん剤 (一般名)	基準投与量	単位	点滴 時間	投与日
パニツムマブ	6	mg/kg	1時間	day1
【特記事項】				