

麻疹注意情報のお知らせ

済生会中津病院ICT

大阪の医療関係者の皆様

- 2月21日付で福岡県より麻疹患者発生報道発表がありました
- 当該の麻疹発症者は、2月15日に発熱で発症し、2月19日に全身性の発疹をきたして後に麻疹と診断されましたが、その前の2月17日に大阪に来られています
- 患者が来阪した当時の麻疹の病気は発疹出現前のカタル期であり、最も麻疹の感染力が強いとされている時期です
- 福岡県の報道提供資料とともに、本日より3月6日までの期間中に、外来および救急受診された患者さんへの診療にあたって留意すべき点について列挙しました
- 万が一麻疹発症者が受診された際には、早期探知にご協力いただきますようお願いいたします

福岡県保健医療介護部保健衛生課
 感染症係 平井・篠原
 内線 3079・3083
 直通 643-3268

麻疹患者の発生について

平成29年2月20日、粕屋保健福祉事務所管内の医療機関から麻疹発生届があり、2月21日に、県保健環境研究所の検査で麻疹陽性であることが判明しました。

当該保健福祉事務所が患者の行動履歴を調査したところ、症状出現前後に航空機等を利用していたことが判明しました。

当該患者が利用した航空機等で患者と接触した方は、麻疹に感染する可能性がありますので、広く情報提供するものです。

■下記の利用便同乗者、駅及び空港利用者の皆様へ

- ・症状から麻疹が疑われる場合、事前に医療機関へ電話連絡の上、速やかに受診してください。
- ・受診の際には、周囲の方へ感染させないように公共交通機関等の利用は控えてください。

■利用便

2月17日	航空機ANA1672便	福岡空港(07:05発)～伊丹空港(08:15着)
	JR大阪環状線	玉造駅(20:00頃発)～大阪駅
	JR東海道本線	大阪駅～新大阪駅(20:30頃着)
	JR山陽新幹線のぞみ57号	新大阪駅(20:42発)～博多駅(23:11着)
	JR福北ゆたか線	博多駅(23:24発)～柚須駅

○麻疹について

- ・感染すると、約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2、3日熱が続いたあと、39℃以上の高熱と発疹が出現します。
- ・感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、感染力は非常に強いと言われています。

1 患者の概要

30代、男性、糟屋郡在住、海外渡航歴あり(2月5日～2月11日)

《症状等の経緯》

- 2月15日 発熱の症状が出現し、医療機関Aを受診
- 2月18日 さらに、咳、鼻汁等の症状が出現したため、医療機関Bを受診
- 2月19日 発疹が出現
- 2月20日 医療機関Cを受診し、臨床症状から麻疹と診断
- 2月21日 県保健環境研究所の遺伝子検査で麻疹陽性を確認

2 医療機関の皆様へ

- ・発熱や発疹を呈する患者が受診した際は、麻疹の予防接種歴の確認等、麻疹の発生を意識した診療をお願いします。
- ・患者(疑い含む。)は、個室管理を行う等、麻疹の感染力の強さを踏まえた院内感染対策を実施してください。
- ・臨床症状等から麻疹と診断した場合には、速やかに保健所へ届け出てください。

3 問い合わせ先

福岡県保健医療介護部保健衛生課 感染症係 電話：092-643-3268

お 願 い

※ 報道機関各位におかれましては、患者及び患者家族等について、本人等が特定されないことがないように、格段の御配慮をお願いします。

受診患者で留意すべき点

(2月27日～3月6日までの期間)

- 40歳未満の成人(特に18～36歳)であること
- これまでに明らかな麻疹罹患歴が無い(または確認できない)
- 38℃台の発熱、咳、鼻水等の症状が出現した後3～4日目に39℃台の高熱と共に全身性の発疹を認める
- 発疹は水胞形成性ではない赤色小丘疹、顔面や頭部から出現して体幹部から四肢に広がる、癒合傾向あり
- 発熱、咳、鼻水等の上気道炎症症状のみであっても、2月17日の夜にJR環状線(玉造～大阪駅間)かまたは東海道線(大阪駅～新大阪駅間)を利用したか